PROYECTO MINERA PANAMA
CLINICA COBRE
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH)

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) .



Es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente, que puede contraerse al tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una persona que tenga el virus.

- EXISTEN MÁS DE 100 TIPOS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH). ALREDEDOR DE 40 TIPOS PUEDEN INFECTAR TU ÁREA GENITAL (TU VULVA, VAGINA, CUELLO UTERINO, RECTO, ANO, PENE Y ESCROTO) ASÍ COMO TU BOCA Y GARGANTA.

EXISTEN DOS CATEGORÍAS DE VPH TRANSMITIDOS POR VÍA SEXUAL:

EL VPH DE BAJO RIESGO QUE CAUSA VERRUGAS GENITALES.
EL VPH DE ALTO RIESGO PUEDE CAUSAR VARIOS TIPOS DE CÁNCER

- CÁNCER DE CUELLO UTERINO
- CÁNCER DEL ANO
- ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER ORAL Y DE GARGANTA
- CÁNCER DE VULVA
- CÁNCER DE VAGINA
- CÁNCER DEL PENE

PREVENCIÓN DEL VPH

EN LAS MUJERES, LAS PRUEBAS DE PAPANICOLAOU PUEDEN DETECTAR CAMBIOS EN EL CUELLO UTERINO QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN CÁNCER.

- PARA HACER LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU SU MÉDICO USA UN INSTRUMENTO LLAMADO ESPÉCULO.
- EL ESPÉCULO SE INTRODUCE EN SU VAGINA Y SE ABRE DE MANERA QUE LAS PAREDES DE SU VAGINA Y CÉRVIX ESTÉN VISIBLES.

VACUNA CONTRA EL VPH

- EN PANAMÁ SE APLICA A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS AL CUMPLIR SUS 10 AÑOS DE EDAD Y PARA SU EFECTIVIDAD SE REQUIEREN DOS DOSIS, LA SEGUNDA DEBE APLICARSE A LOS 6 MESES DESPUÉS DE SER APLICADA LA PRIMERA DOSIS.
- ES GRATUITA

VACUNA CONTRA VPH

Se inyectan partículas similares al virus

El sistema inmune crea los anticuerpos y guarda "memoria" de cómo hacerlos. Esto le toma meses.

Ante la llegada de un virus real, el sistema inmune rápidamente crea anticuerpos y destruye el virus.

TRATAMIENTO PARA EL VPH

- CIRUGÍA DE CAUTERIZACIÓN (LÁSER) REALIZADAS DURANTE VARIAS SESIONES POR EL MÉDICO.



VIH - SIDA

QUE ES EL VIH?

EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) ES EL CAUSANTE DEL SIDA Y SE ENCUENTRA ESENCIALMENTE EN LA SANGRE, SEMEN Y FLUIDOS VAGINALES DE UNA PERSONA INFECTADA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA LECHE MATERNA DE UNA MADRE INFECTADA. ESTOS SON LOS ÚNICOS FLUIDOS QUE PUEDEN INFECTARSE. EL VIH ATACA Y DEBILITA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO QUE SON LAS DEFENSAS NATURALES DEL CUERPO.

QUE ES EL SIDA?

EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) ES EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES E INFECCIONES OPORTUNISTAS QUE SE MANIFIESTAN EN LA ETAPA TERMINAL O DE MAYOR DESARROLLO DEL VIRUS VIH EN EL CUERPO HUMANO.

QUE ES UNA PERSONA VIH POSITIVA?

ES TODA AQUELLA PERSONA QUE HA SIDO INFECTADA Y QUE RESULTA POSITIVA EN LAS PRUEBAS PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS DEL VIRUS VIH. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA SEA VIH POSITIVA NO SIGNIFICA QUE TENGA SIDA.

SIGNOS Y SINTOMAS

- EN GENERAL, LAS PERSONAS QUE CONTRAEN LA INFECCIÓN LUCEN Y SE SIENTEN SANAS DURANTE MUCHO TIEMPO. PUEDEN TRANSCURRIR 10 AÑOS O MÁS HASTA QUE LA INFECCIÓN POR VIH MANIFIESTA SÍNTOMAS

ETAPA TEMPRANA

LAS PRIMERAS 2 A 4 SEMANAS DESPUÉS DE CONTRAER EL VIH, PUEDES SENTIRTE AFIEBRADO, CON DOLOR Y MALESTAR. ESTOS SÍNTOMAS SIMILARES A LOS DE LA GRIPE SON LA PRIMERA REACCIÓN DEL CUERPO A LA INFECCIÓN POR EL VIH.

DURANTE ESTA ETAPA, HAY UNA GRAN CONCENTRACIÓN DEL VIRUS EN TU ORGANISMO, DE MODO QUE ES FÁCIL TRANSMITIRLO A OTRAS PERSONAS.

SÍNTOMAS TARDÍOS DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA

EL VIH DESTRUYE LAS CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO Y AL ORGANISMO SE LE HACE MUY DIFÍCIL COMBATIR LAS ENFERMEDADES. ESTO HACE MÁS PROPENSO A ENFERMAR GRAVEMENTE POR INFECCIONES QUE GENERALMENTE NO HARÍAN DAÑO.

UNA PERSONA TIENE SIDA CUANDO SUFRE INFECCIONES DENOMINADAS OPORTUNISTAS. ESTO SUCEDE ALREDEDOR DE 10 AÑOS DESPUÉS DE CONTRAER EL VIH Y NO RECIBIR TRATAMIENTO. CON TRATAMIENTO, LA APARICIÓN DEL SIDA PUEDE TARDAR MUCHO MÁS.

SIGNOS Y SINTOMAS

- CANSANCIO PERSISTENTE, MAREOS
- DOLORES DE CABEZA
- PÉRDIDA BRUSCA DE PESO
- DIARREA, FIEBRE, O SUDORES NOCTURNOS DURANTE MUCHO TIEMPO
- GLÁNDULAS INFLAMADAS O DURAS EN LA GARGANTA, LAS AXILAS O LA INGLE
- EPISODIOS DE TOS SECA Y PROFUNDA
- SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE
- PROTUBERANCIAS VIOLÁCEAS EN LA PIEL O EN LA BOCA
- SANGRADO DE LA BOCA, LA NARIZ, EL ANO O LA VAGINA
- ERUPCIONES DE LA PIEL

CÓMO ENTRA EL VIRUS EN EL CUERPO?

- AL TENER RELACIONES SEXUALES CON UNA PERSONA INFECTADA SIN EL USO DEL CONDÓN O SIN PROTECCIÓN.

- DE UNA MADRE INFECTADA A SU BEBE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DEL PARTO EN LA LACTANCIA.

- POR MEDIO DE UNA TRANSFUSIÓN DE SANGRE QUE ESTE INFECTADA.

- AL COMPARTIR JERINGUILLAS INFECTADAS O CUALQUIER MATERIAL PUNZO CORTANTE RECIÉN INFECTADO.



CÓMO NO ENTRA EL VIRUS AL CUERPO?

- POR CARICIAS, ABRAZOS, CONTACTO CASUAL O SALUDOS.

- POR CONTACTO CON SUDOR, LAGRIMAS O SALIVA.

- POR COMPARTIR COMIDA, UTENSILIOS, CUBIERTOS, TOALLAS, BAÑOS O INODOROS.

- POR PICADURAS DE MOSQUITOS.

- Por nadar en la misma piscina o bañarse en lugares públicos.

DIAGNOSTICO

EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH SE BASA EN UNA PRUEBA DE LABORATORIO, RÁPIDA Y SEGURA, LA CUAL DEMUESTRA LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIH. ESTE RESULTADO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL.

TRATAMIENTO

EL MINISTERIO DE SALUD DE PANAMÁ OFRECE A LAS PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH UN MANEJO MULTIDISCIPLINARIO, CON CLÍNICAS DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN EL PAÍS, CON PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA CAPACITADO EN VIH, INFECTÓLOGOS Y PSICÓLOGOS. BRINDA ADEMÁS DE LOS MEDICAMENTOS, LAS FÓRMULAS MATERNIZADAS PARA LOS LACTANTES, HIJOS DE MADRES CON VIH QUE NO PUEDEN RECIBIR LACTANCIA MATERNA, EVITANDO LA TRANSMISIÓN DEL VIH AL LACTANTE.

EL VIH/ SIDA NO TIENE CURA

ATRIPLA ES UN MEDICAMENTO ANTIVIRAL QUE PREVIENE QUE EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) SE REPRODUZCA EN SU CUERPO. ATRIPLA SE USA PARA TRATAR EL VIH, EL VIRUS QUE PUEDE CAUSAR EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA), PERO ATRIPLA NO ES UNA CURA PARA EL VIH O SIDA". ATRIPLA ESTÁ COMPUESTO POR TRES FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES: EFAVIRENZ (SUSTIVA), EMTRICITABINA (EMTRIVA) Y TENOFOVIR (VIREAD).

- LA ATRIPLA TIENE UN COSTO DE $54 POR CADA PACIENTE, PERO SI ESTA LÍNEA FALLA, EL PACIENTE PASARÍA A LA SEGUNDA LÍNEA Y ESTE TRATAMIENTO TIENE UN COSTO DE $300 POR PACIENTE, EN TANTO QUE EL DE TERCERA LÍNEA ES DE $1,200 POR PERSONA


DATOS SOBRE EL SIDA
AL AÑO 2015 Y 2016
16,493
personas viven con VIH/Sida en el país actualmente
1,587
casos nuevos fueron notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológico, en 2016
28.1%
ocurrió en mujeres, y de estas, 42.7% correspondió a mujeres embarazadas
CIFRAS EN PANAMÁ
PREVALENCIA
0.69%
Se estima la prevalencia de personas infectadas con VIH.
En Panamá la población total es de 3.5 millones, según el Censo Nacional 2010.
16,068
personas en el país sufren el VIH/sida hasta el mes de diciembre de 2016.
Regiones con más casos de VIH en 2016
Metropolitana 461
San Miguelito 212
C. Ngäbe Buglé 173
Colón 139
•infografía La Prensa •fuente Onusida y Minsa

QUÉ ES PREVENCIÓN?

Es prevenir, evitar o prever algo que puede ocurrir, así como sus implicaciones y consecuencias. En el caso específico del VIH-SIDA consiste en el ejercicio y conocimiento de una serie de medidas de precaución y seguridad con el fin de evitar la infección por la transmisión del virus VIH, que consecuentemente causa el SIDA.

MÉTODOS DE PREVENCIÓN:

- ✓ Educación y concienciación
- ✓ Uso correcto de preservativos
- ✓ Fidelidad mutua





DISCRIMINACION

- EL VIH NO DISCRIMINA POR RAZÓN DE EDAD, RAZA, SEXO O SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, Y CUALQUIER PERSONA SEXUALMENTE ACTIVA PUEDE CONTRAERLO SI NO UTILIZA MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEXUAL. LA FALTA DE INFORMACIÓN Y EL DESCONOCIMIENTO HACEN QUE TODAVÍA HOY LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON VIH SEAN VÍCTIMAS DE SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y VULNERACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-BUTQW9VRMY

POR TU SALUD, PROTÉGETE.

1 de diciembre.
Día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA.

VALLADOLID DIVERSA

MUCHAS GRACIAS

- DUDAS
- COMENTARIOS
- APORTES